

ชนิดของวัณโรคดื้อยา	สูตรยาที่ใช้รักษา	ชนิดยา
วัณโรคทั่วไป	HRZE (1-New patient regimen)	Isoniazid Rifampicin Pyrazinamide Ethambutol
MDR/RR-TB	BPaLM (10-BPaLM)	Bedaquiline Pretomanid Linezolid Moxifloxacin
	9-month all oral (6-all oral shorter)  4-6 <b>Bdq</b> -Mfx-Pto-Cfz-Z-Hhigh-dose-E / 5 Mfx-Cfz-Z-E  4-6 เดือนแรก มียา 7 ตัว หลังจากนั้น เหลือยา 4 ตัว	Bedaquiline Levofloxacin Moxifloxacin Prothionamide Ethionamide Linezolid Clofazimine Pyrazinamide Isoniazid Ethambutol
	individualized longer (3-individualized longer regimen)	Levofloxacin Moxifloxacin Bedaquiline Linezolid Clofazimine Cycloserine Terizidone Ethambutol Delamanid Pyrazinamide Imipenem-cilastatin Meropenem Amikacin Streptomycin Ethionamide Prothionamide p-aminosalicylic acid
PreXDR-TB	BPaL (9-BPaL regimen)	Bedaquiline Pretomanid Linezolid
	individualized longer (3-individualized longer regimen)	Levofloxacin Moxifloxacin Bedaquiline Linezolid Clofazimine Cycloserine

		Terizidone Ethambutol Delamanid Pyrazinamide Imipenem-cilastatin Meropenem Amikacin Streptomycin Ethionamide Prothionamide p-aminosalicylic acid
XDR-TB	individualized longer (3-individualized longer regimen)	Levofloxacin Moxifloxacin Bedaquiline Linezolid Clofazimine Cycloserine Terizidone Ethambutol Delamanid Pyrazinamide Imipenem-cilastatin Meropenem Amikacin Streptomycin Ethionamide Prothionamide p-aminosalicylic acid
	other (11-other)  ถ้า เลือก อื่นๆ ให้ระบุเหตุผล 1.แพทย์เปลี่ยนสูตรยา 2.ผู้ป่วยเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากยา 3.ผู้ป่วยดื้อยาเพิ่ม 4.ผู้ป่วยไม่ตอบสนองต่อสูตรยาเดิม 5.ผลเสมหะยังพบเชื้อ 6.อื่นๆ	Isoniazid Rifampicin Pyrazinamide Ethambutol Levofloxacin Moxifloxacin Bedaquiline Linezolid Clofazimine Cycloserine Terizidone Delamanid Imipenem-cilastatin Meropenem Amikacin Streptomycin Ethionamide Prothionamide p-aminosalicylic acid Clavulanic acid Pretomanid Kanamycin